HAIE

3 espèces d'arbustes

1

2

3

LAURIER CERISE

Famille : *Rosaceae*
Espèce *: Prunus laurocerasus*
Hauteur : jusqu'à 8 m
Répartition : arbuste à **feuillage persistant** utilisé comme plante ornementale ou pour constituer des haies touffues.
Feuilles : feuilles **simples alternes brillantes et lancéolées**, 100 à 200 mm de longueur.
Fleurs : **blanches.**
Fruits : **drupes** à noyau très toxique.
Propriétés
Feuilles utilisées pour aromatiser les plats mais en faible quantité, en raison de leur toxicité.
Eau distillée des feuilles jeunes : propriétés thérapeutiques (antispasmodique, sédatif, anti-inflammatoire, antalgique, cicatrisant).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurier-cerise





Mahonia à feuilles de houx

Famille : *Berberidaceae*
Espèce *: Berberis aquifolium*
Hauteur : 0,5 à 2 m
Répartition : Arbuste à feuillage **persistant** utilisé comme plante ornementale ou pour constituer des haies.
Feuilles : **composées**, constituée de **5 à 9 folioles**, coriaces et luisantes, elles portent des **dents épineuses** sur ses bords et rougissent en hiver.
Fleurs : réunies en **grappes,** jaunes, à l'odeur de miel.
Fruits : **baies** bleuâtres à noires appréciées des oiseaux.
Propriétés : Peut être utilisé pour soigner des maladies de peau (eczéma, psoriasis…).
Les fruits sont comestibles s'ils sont cuits (gelées, liqueurs), crus, ils peuvent provoquer des troubles digestifs. Les racines peuvent aussi produire des teintures jaunes et les baies des teintures rouges.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Berberis_aquifolium


A066 640x480 2022/03/29 15:23:12


A067 640x480 2022/03/29 15:23:26

Cotonéaster de Franchet

Famille : *Rosaceae*
Espèce *: cotoneaster franchetti*
Hauteur : jusqu'à 3 m
Répartition : arbuste à **feuillage persistant**, utilisé comme plante ornementale ou pour constituer des haies.
Feuilles : **Ovales** jusqu'à 3,5 cm de long et 1,5 cm de large, pointues et **alternes.** Vert brillant sur la face supérieure, **duveteuses**, sur la face inférieure.
Fleurs : regroupées en **grappe** de **5 à 15 fleurs**, (jusqu'à 7 mm), munies de **5 pétales** blancs à l'intérieur et rose à l'extérieur. Les fleurs fructifient tardivement (octobre) et les fruits (6 à 9 mm de diamètre) persistent en hiver, constituant une source de nourriture notamment pour les oiseaux frugivores durant cette période où la nourriture se raréfie.
Propriétés : D'après certaines études, cet arbuste serait un bon candidat pour absorber la pollution atmosphérique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotoneaster_franchetii

A056 640x480 2022/03/29 15:17:26

A054 640x480 2022/03/29 15:16:35

A057 640x480 2022/03/29 15:17:52



A055 640x480 2022/03/29 15:17:08

Tilleul à petites feuilles

Famille : *Malvaceae*
Espèce *: Tilia cordata*
Hauteur : de 20 à 30 m
Répartition : Europe, Asie
Feuilles : **alternes**, longues de 3 à 8 cm, en **forme de cœur**, finement **dentées** et **glabres**. Vertes dessus et **glauques** dessous.
Fleurs : jaune-blanchâtre, constituées d'une **bractée**, pollinisées par les insectes, elles fleurissent en juillet.
Fruits : **globuleux**, petits (5 à 8 mm de diamètre).
Propriétés : bois tendre et peu résistant. Abri pour les insectes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tilleul_%C3%A0_petites_feuilles